

# がん化学療法regimen登録票

No	プロトコール名	略名
NSC-04A	ニボルマブ(NIVO)+ペトレキセド(PEM)+シスプラチン(CDDP)併用療法	NIVO+PEM+CDDP
適応病名		
非小細胞肺癌		
所要時間		1Course期間
7時間		21日間

## 実施計画

投与順序	薬品名(略号)	Dose	投与経路	投与時間	投与日
1	ソルデム®1輸液500mL MgSO4注 KCL注	8mEq 10mEq	d.i.v. メイン	1hr	day-1
2	ソルデム®1輸液500mL		d.i.v. メイン	1hr	day-1
2'	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg アロカリス®点滴静注235mg デキサメタゾン注	9.9mg	d.i.v. 側管	30min	day-1
3	生理食塩液100mL オプジーボ®注(NIVO)	360mg/body	d.i.v. メイン	30min	day-1
4	生理食塩液50mL		d.i.v. メイン	30min	day-1
5	生理食塩液100mL ペトレキセド注(PEM)	500mg/m <sup>2</sup>	d.i.v. メイン	10min	day-1
6	マンニトールS注200mL		d.i.v. メイン	30min	day-1
7	生理食塩液300mL シスプラチン注(CDDP)	75mg/m <sup>2</sup>	d.i.v. メイン	1hr	day-1
8	ソルデム®1輸液500mL KCL注	10mEq	d.i.v. メイン	1hr	day-1
9	ソルデム®1輸液500mL		d.i.v. メイン	1hr	day-1
1	ソルデム®3A輸液1000mL ※入院時のみ		d.i.v. メイン	5hr	day-2

## 支持療法

薬品名	Dose	投与経路	投与時間	投与日	目的
デキサメタゾン錠4mg	2T	p.o.	2×MT	day-2~5	制吐
調剤用パンビタン®末	1g	p.o.	1×M	day-7~21	葉酸補充
メチコバル®注	2A	i.m.	初回:PEM投与の1週間以上前 以後:3course毎に		VB12補充