

# がん化学療法regimen登録票

No	Regimen名称	略名
NSC-26	アミバンタマブ(AMI)+ラゼルチニブ(LAZ)併用療法	AMI+LAZ
適応病名		
EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌		
所要時間		1Course期間
3～8時間		28日間

## 実施計画

投与順序	薬品名(略号)	Dose	投与経路	投与時間	投与日
1	ジフェンヒドラミン錠10mg 5T	50mg	p.o.		1コース目: day-1.2.8.15.22 2コース目以降: day-1.15
1'	アセトアミノフェン錠500mg 2T	1000mg	p.o.		1コース目: day-1.2.8.15.22 2コース目以降: day-1.15
1''	生理食塩液50mL デキサメタゾン注 ガスター注20mg	9.9mg	d.i.v. メイン	15min	1コース目: day-1.2.8.15.22 2コース目以降: day-1.15
2	生理食塩液50mL		d.i.v. メイン	45min	1コース目: day-1.2.8.15.22 2コース目以降: day-1.15
3	生理食塩液250mL ライブリバント®(AMI)		d.i.v. メイン	2～6hr	1コース目: day-1.2.8.15.22 2コース目以降: day-1.15
4	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	1コース目: day-1.2.8.15.22 2コース目以降: day-1.15
	ラズクルーズ®錠(LAZ)	240mg	p.o.	1日1回	連日

## 支持療法

薬品名	Dose	投与経路	投与時間	投与日	目的
アピキサバン錠2.5mg	2T	p.o.	2×MA	連日(4ヶ月)	静脈血栓塞栓症発症抑制
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg	4T	p.o.	2×MA	連日(8週)	皮膚障害予防
ヒルドイド®ローション	体幹・四肢に塗布		1日数回	連日	皮膚障害予防
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション	体幹・四肢・頭部に塗布		1日2回	連日	皮膚障害予防
ロコイド®クリーム	顔面に塗布		1日2回	連日	皮膚障害予防
ダラシン®ゲル	体幹・四肢・顔面に塗布		1日2回	連日	皮膚障害予防