

癌化学療法regimen登録票

No	プロトコール名	略名
NSC-09	ペバシズマブ(BV)+ペムトレキセド(PEM)+カルボプラチン(CBDCA)併用療法	BV+PC
適応病名		
扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌		
所要時間	1Course期間	
3時間	21日間	

実施計画

投与順序	薬品名(略号)	Dose	投与経路	投与時間	投与日
1	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg アロカリス®点滴静注235mg デキサメタゾン注	6.6mg	d.i.v. メイン	30min	day-1
2	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-1
3	生理食塩液100mL ベバシズマブ注(BV)	15mg/kg	d.i.v. メイン	初回:90min 2回目:60min 以降:30min	day-1
4	生理食塩液100mL ペムトレキセド注(PEM)	500mg/m ²	d.i.v. メイン	10min	day-1
5	5%ブドウ糖液250mL カルボプラチン注(CBDCA)	AUC:5	d.i.v. メイン	1hr	day-1
6	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-1

支持療法

薬品名	Dose	投与経路	投与時間	投与日	目的
デキサメタゾン錠4mg	1T	p.o.	1×M	day-2~4	制吐
調剤用パンピタン®末	1g	p.o.	1×M	day--7~21	葉酸補充
メチコパール®注	2A	i.m.	初回:PEM投与の1週間以上前 以後:3course毎に		VB12補充