

癌化学療法regimen登録票

No	プロトコール名	略名
SC-02	エトポシド(VP-16)+シスプラチン(CDDP)併用療法	PE
適応病名		
71～74歳 進展型(ED)小細胞肺癌、完全切除後小細胞肺癌		
所要時間		1Course期間
day-1 7時間 day-2.3 5時間強		21日間

実施計画

投与順序	薬品名(略号)	Dose	投与経路	投与時間	投与日
1	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg アロカリス®点滴静注235mg デキサメタゾン注	9.9mg	d.i.v. メイン	30min	day-1
2	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-1
3	ソルデム1輸液500mL MgSO4注 KCL注	8mEq 10mEq	d.i.v. メイン	1hr	day-1
4	5%ブドウ糖液500mL エトポシド注(VP-16)	100mg/m ²	d.i.v. メイン	90min	day-1
5	マンニトールS注200mL		d.i.v. メイン	30min	day-1
6	生理食塩液300mL シスプラチン注(CDDP)	80mg/m ²	d.i.v. メイン	1hr	day-1
7	ソルデム1輸液500mL KCL注	10mEq	d.i.v. メイン	1hr	day-1
8	ソルデム1輸液500mL		d.i.v. メイン	1hr	day-1
1	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-2.3
2	5%ブドウ糖液500mL エトポシド注(VP-16)	100mg/m ²	d.i.v. メイン	90min	day-2.3
3	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-2.3

支持療法

薬品名	Dose	投与経路	投与時間	投与日	目的
デキサメタゾン錠4mg	2T	p.o.	2×MT	day-2～5	制吐